Rapport sur un Nouveau moyen d'operer la fistule Lachrymale par Mr jurine Chirurgien de l'hopital General a Geneve.

pour faire valoir ce Nouveau moyen l'Auteur fait l'exposé sommaire de ceux qui sont connus jusqu'a present, mais il n'oublie point de decrire les difficultés qu'on eprouve quelque fois pour les metre en execution.

son moyen consiste en une Canule d'or, longue de deux pouces et demi, legerement courbée et terminée par une pointe de trois quart en acier. cette pointe est percée

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 43 n.51 (5)

d'un trou ovale sur une de ses faces
et la canule reçoit une aiguille d'or
applatie et recourbée.
l'Auteur se sert de cette canule pour percer
la tumeur Lachrymale et pour désobstruer
la route des larmes. lorsque cette canule est
parvenue dans la cavitée formée par
l'écartement du cornet inferieur du nés, il pousse
l'aiguille d'or, elle se courbe en avant et se
présente a l'orifice de la narine ou elle
est assés facile a saisir avec un crochet.
la sortie de l'aiguille entraine une soye
double qui sert a conduire une meche de
4, 6, et 8 brains de coton que l'Auteur
entretient pendant 25 jours. dans les premiers
pansemens, il charge cette meche d'un melange

de Basilicum et de Baume d'Arceus,
ensuite il l'humecte avec le Baume du
commandeur vraisemblablement jusqu'à
la fin de la cure.

M. Jurine prétend que son procédé réunit la
la non difformité, la simplicité et la facilité
dans l'exécution de l'opération; cela peut être
mais la cure du malade est elle aussi certaine
que l'auteur l'annonce il auroit du étayer son
Mémoire de plusieurs observations bien vues
et examinées six mois après l'opération; nous
sommes bien éloignés de croire que le seton
ainsi que le propose l'Auteur puisse favoriser
la guérison sans larmoyement. en effet le
seton ne parcourant point toute la longeur
des voyes lachrymales, il arrive que par ce

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 43 n.51 (6)

procedé il se fait quelque point d'adherence
du muscle orbiculaire avec le sac lachrymale
et cette adherence intercepte la communication
des points et conduits lachrymaux d'avec le
sac et le canal nasal. la playe exterieure se guerit
mais les malades larmoyent toujours. ainsi on
ne peut considerer cette cure comme complette
il resulte de ce nous venons d'exposer que
ce nouvel instrument ne nous offre aucun
avantage c'est pourquoi nous ne croyons pas
devoir l'approuver.

la corde à boyau est un moyen
plus simple et aussi aisé a faire
sortir des fosses nazelles avec un
crochet de Balanguier ——

ce 22. 7bre 1785.

signé Becquet

ce rapport etoit joint avec un autre sur une heureuse